

成功高中學生第 2 劑 BNT 疫苗接種相關資訊

(新增：集中接種日訂於 110 年 12 月 21 日星期二、臺大醫院心電圖篩檢研究案)

成功高中學務處 110 年 12 月 3 日整理

各位老師、學生家長、同學好：

一、中央流行疫情指揮中心建議：國人應按時程接種第 2 劑 COVID-19 疫苗。已接種第 1 劑 BNT 疫苗，且無發生嚴重不良反應，且間隔 12 週以上之 12-17 歲青少年，接種第 2 劑 BNT 疫苗。

二、本校學生第 2 劑 BNT 疫苗校園集中作業，訂於 **110 年 12 月 21 日(星期二)**辦理，地點於綜合大樓五樓活動中心。

三、校園疫苗接種作業，遵循以下原則：

1. **完善施打規劃，確保流程順暢**：本次預定由「聯合醫院和平院區」醫療團隊承辦施打作業，與第 1 劑承辦醫院相同。
2. **尊重接種者意願**：事前發放接種意願書與注意事項給學生，依意願書回報情形安排接種作業。
3. **關心學生健康**：若學生接種後有不良反應，學校將及時協助。

四、以下事項請家長協助：

1. 請家長確認貴子弟的「**接種黃卡**」與「**健保卡**」是否妥善保存。
 - (1) 若學生遺失健保卡，申請補發請參考衛福部中央健康保險署：<https://reurl.cc/em22r7>
 - (2) 若學生遺失接種黃卡，請回到原接種醫療院所 申請補發（第 1 劑於本校集中接種者，申請補發黃卡請至「和平醫院家醫科」）。
 - (3) 以上補發程序酌收之工本費，依補發單位規定辦理。
2. 請家長務必與貴子弟討論接種意願，及詳讀接種前後注意事項。

※接種意願書與注意事項之發放時間，將另行公布。
3. 若貴子弟於「校外」接種新冠疫苗，不論第幾劑，哪一個廠牌，請向導師與學務處回報。
回報內容：「班級座號姓名」、「接種日期」、「接種第幾劑」、「接種廠牌」。
4. 不論貴子弟於校內或校外接種新冠疫苗，若接種後身體不適，請務必向導師與學務處回報。
5. 若貴子弟規劃於校外接種流感疫苗，請務必與新冠疫苗間隔 7 日以上。貴子弟於校外接種流感疫苗後請回報健康中心，以登錄流感疫苗接種情形。

五、其餘有關新冠疫苗接種的問與答，依本校目前向教育局掌握資訊，羅列於下：(持續增加中)

1. 若學生至今尚未接種第 1 劑，能不能在學校跟著接種第 1 劑？

A：可以，並請於接種意願書上註明：本次為接種第 1 劑。

2. 若學生已在「校外」接種第 1 劑，能不能在學校接種第 2 劑？

A：分為下列幾種狀況。

(1) 若接種第 1 劑已滿 12 週，則可以在學校接種第 2 劑。

(2) 若接種第 1 劑「未滿」12 週，且「未滿」18 歲，則「不可以」在學校接種第 2 劑。

(3) 滿 18 歲之學生，若接種第 1 劑「滿 4 週」(但未滿 12 週)，亦可以在學校接種第 2 劑。

3. 考慮高三學生即將面臨學測，集中接種是否有替代方案？

A：如下分述。

(1) 高三學生可選擇是否在學校集中接種。

(2) 高三學生如考量學測無法在校集中接種者，教育局擬於大考結束後另安排時間集中接種(併同學校設站當日無法接種之其他學生)。若有更詳細的資訊將再公布。

六、12-17 歲青少年接種 BNT 第 2 劑疫苗後相關不良反應(資料來源：中央流行疫情指揮中心)

2021/11/28 ACIP專家會議

12-17歲青少年第2劑BNT疫苗接種建議

- 由於COVID-19病毒變異株持續於國際間流行，為提升社區群體免疫力，為確保國內防疫安全，國人應按時接種第2劑COVID-19疫苗，並建議已接種第1劑BNT疫苗且無發生嚴重不良反應之12-17歲青少年族群，間隔12週以上，接種第2劑BNT疫苗。
- 接種第2劑後發生心肌炎/心包膜炎之比率高於第1劑，且年輕男性發生比例較高。提醒民衆於接種BNT疫苗後28天內，如出現下列任一疑似症狀，應立即就醫
症狀包括胸痛、胸口壓迫感或不適、心悸(心跳不規則、跳拍或“顫動”)、暈厥(昏厥)、呼吸急促、運動耐受不良(例如走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯)等

中央流行疫情指揮中心 2021/11/29

青少年接種COVID-19第2劑BNT 間隔時間建議為12週以上

- 目前研究顯示，第2劑BNT疫苗延長至6-14週接種，並不會影響疫苗引起之抗體及細胞性免疫。
- 根據加拿大、歐盟及英國監測數據顯示，延長第2劑接種間隔可能會減少心肌炎發生比率，惟2劑接種間隔與心肌炎發生比率之關聯性尚未被證實。
- 目前英國建議16-17歲青少年接種2劑BNT疫苗，2劑間隔12週以上。

中央流行疫情指揮中心 2021/11/30

12-17歲青少年接種BNT 第2劑疫苗後相關不良反應

- 接種完第2劑COVID-19 mRNA疫苗後，不良反應發生比率會比第1劑高。
- 心肌炎/心包膜炎為較須注意的不良反應，於年輕男性發生比例較高。提醒民衆於接種BNT疫苗後28天內，如出現胸痛、胸口壓迫感或不適、心悸(心跳不規則、跳拍或“顫動”)、暈厥(昏厥)、呼吸急促、運動耐受不良(例如走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯)等疑似症狀，應立即就醫。

※其他接種疫苗後反應：多為接種部位腫痛、疲倦、頭痛、肌肉關節痠痛、噁心、畏寒、體溫升高、發燒(≥38°C)等，一般約48小時可緩解，如有持續發燒超過48小時、呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫病因。

中央流行疫情指揮中心 2021/11/30

七、本校行政同仁於 12 月 2 日參加臺北市政府教育局召開「臺北市學生 BNT 第 2 劑心肌炎研究說明會」，相關資訊說明如下：

1. 為了解「接受第二劑 BNT162b2 的臺北市高中學生，於疫苗施打兩天後給予心電圖篩檢，是否能早期偵測心肌炎」，臺大醫院邀請本校願意接種第二劑 BNT 疫苗，且已經接種第一劑 BNT 疫苗的學生參加「以心電圖篩檢早期偵測 BNT 新冠肺炎疫苗引起的心肌炎」研究計畫。
2. 符合受試者資格(願意接種第二劑 BNT 疫苗，且已經接種第一劑 BNT 疫苗)的學生，可以自由決定是否參加，且須與家長共同簽署受試同意書後，才能參與本研究。
3. 受試同意書之發放與收回期程，將另行通知。
4. 綜上，同意參加本研究的學生，將參與之活動期程列於下表：

日期	12 月 17 日(五)	12 月 21 日(二)	12 月 23 日(四)
活動	施作第 1 次心電圖 (事前簽署受試同意書、填寫網路問卷)	第 2 劑 BNT 疫苗校園接種 (事前繳交接種意願書)	施作第 2 次心電圖 (事前填寫網路問卷)